

## ЕДНОВРЕМЕННОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА **REPAGLINIDE** И **GEMFIBROZIL** Е ПРОТИВОПОКАЗАНО

ИАЛ ви уведомява за скоро съобщено лекарствено взаимодействие при здрави доброволци, които като участници в клинично проучване приемали едновременно repaglinide(лекарствен продукт за понижаване на кръвната захар) и gemfibrozil(лекарствен продукт за понижаване на липидите в кръвта) и това е довело до значително увеличаване на терапевтичното въздействие на repaglinide с последващ риск от тежка остро настъпила хипогликемична криза.

Тежестта на потенциалните последици от това взаимодействие е причина за спешни мерки от страна на Европейската агенция за оценка на лекарствата- ЕМЕА и промяна в разделите "Противопоказания" и "Лекарствени взаимодействия" в Кратката характеристика и Листовката за пациента на лекарствения продукт repaglinide.

У нас са разрешени за употреба лекарствените продукти NovoNorm (repaglinide) tabl. 0,5mg, 1mg, 2mg, с притежател на разрешението за употреба Novo Nordisk и Ipolipid (gemfibrozil) caps. 300mg, с притежател на разрешението за употреба Medochemie Ltd.

На 21.05.2003 Експертният съвет по лекарствена безопасност към ИАЛ одобри текста на писмо "Dear Doctor Letter" на фирмата Novo Nordisk за лекарствения продукт NovoNorm (repaglinide) в което лекарите се уведомяват за наблюдението на лекарствено взаимодействие с gemfibrozil и необходимостта едновременното приложение на двата продукта да се счита за противопоказано. Освен това лекарите се съветват да преоценят лечението на пациентите си вече приемали тази лекарствена комбинация и да се насочат към алтернативно лечение, като се следи стриктно съдържанието на захар в кръвта. Пациентите, приемали тези лекарства в комбинация се съветват да потърсят незабавно лекарска помощ за преоценка на лечението.